

**Инструкция по медицинскому применению
СИАВИР
Ацикловир 3% м/м
Мазь для наружного применения**

СОСТАВ:

Ацикловир Б.Ф. 3.0% м/м
Основа мазь q.s.

ОПИСАНИЕ:

Препарат «СИАВИР» - это фирменное название ацикловира, аналога синтетического нуклеозида, который используется в борьбе с герпесными вирусами. Препарат «СИАВИР» (Ацикловир Мазь 3% w/w) - является лекарственным препаратом для наружного применения. Ацикловир, противовирусным препаратом. Препарат замедляет рост и распространение вируса герпеса так чтобы организм мог бороться с инфекцией. Ацикловир Мазь 3% w/w используется при лечении поражений, вызванных генитальным герпесом. Ацикловир Мазь 3% w/w – это полутвердая масса белого цвета, заполненная в тубчик.

ФАРМАКОДИНАМИКА:

Фармакотерапевтическая группа: аналог нуклеозида
Код АТС: D06BV03

Механизм действия:

Ацикловир – это аналог синтетического пури нуклеозида с ингибиторной активностью вне лаборатории и в организме в борьбе с симплексными видами герпеса 1 (HSV-1), 2 (HSV-2), и вирусом ветряной оспы (VZV). Ингибиторная активность Ацикловира очень высокоселективная, благодаря своему сходству с тимидинкиназой, зашифрованных HSV и VZV. Данный вирусный фермент превращает Ацикловир в монофосфатный Ацикловир – аналог нуклеозида. Более того, монофосфат превращается в дифосфат посредством клеточного гингулат киназа и трифосфат посредством количества клеточных ферментов. В лабораторных условиях, Ацикловир трифосфат останавливает размножение вируса герпеса в ДНК. Данный процесс выполняется 3 способами:

1. Конкурентное ингибирование вирусного ДНК полимеразы;
2. Внедрение и завершение роста вирусной цепи ДНК;
3. Дезактивация ингибирование вирусного ДНК полимеразы.

Наибольшая активность Ацикловира в борьбе с HSV и по сравнению с VZV происходит благодаря более эффективного фосфорилирования вирусным ТК.

ФАРМАКОКИНЕТИКА:

Абсорбция: Минимальная системная абсорбция
Выведение: Моча (<0.02-9.4%, инфицированные VZV).

НАЗНАЧЕНИЕ:

Препарат «СИАВИР» (Ацикловир Мазь 3% w/w) назначается при борьбе с изначальным проявлением генитального герпеса и ограниченным, не угрожающих жизни кандидозом симплексных вирусов герпеса у пациентов с ослабленным иммунитетом.

ДОЗА И МЕТОДЫ НАЗНАЧЕНИЯ:

Доза для взрослых:

Генитальный герпес:

Изначальная инфекция:

Нанесите достаточное количество (примерно 1/2-двоймов на участок тела/4 кв. дюйма площади поверхности) на повреждения – 6 раз в день, на протяжении 7 дней.

Как можно раньше определите наличие нижеперечисленного списка знаков / симптомов:

Герпесный симплекс:

Ограниченный, не угрожающий жизни кандидоз симплексных вирусов герпеса у пациентов с ослабленным иммунитетом: Нанесите достаточное количество (примерно 1/2-двоймов на участок тела/4 кв. дюйма площади поверхности) на повреждения – 6 раз в день, на протяжении 7 дней.

Способ применения:

Локальное нанесение.

Наносите кончиком пальца или с резиновыми перчатками во избежание автономической инокуляции или передачи болезни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Препарат «СИАВИР» (Ацикловир Мазь 3%w/w) противопоказан пациентам с выраженной чувствительностью к одному из компонентов формулы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Только для наружного применения; избегайте попадания в глаза.

Не превышайте рекомендованную дозу и период проведения лечения. Нет никаких данных о предотвращение заражения инфекцией или предотвращения повторного проявления инфекции. Ацикловир Мазь 3%w/w должна быть использована для предотвращения HSV инфекций. Кроме того, не была проявлена клинически заметная стойкость вируса, связанная с использованием мази Ацикловир 3%w/w.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПРИЕМ ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТВ:

Прием других лекарственных препаратов может повлиять на воздействие нанесенного Ацикловира. Но многие лекарства способны взаимодействовать друг с другом, включая витамины и препараты на основе лекарственных растений.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ:

Беременность: Ацикловир не должен использоваться во время беременности; существует риск нанесения потенциального вреда плоду. Также должно быть в внимание, что высокая концентрация Ацикловира может вызвать разлом хромосомы в лабораторных условиях.

Лактация: При систематическом нанесении, Ацикловир может проникнуть в грудное молоко. Несмотря на то, что Ацикловир проникает сквозь кожу в минимальном количестве, следует соблюдать особую осторожность при назначении Ацикловира кормящим матерям.

Дети: Безопасность использования мази Ацикловир 3%w/w детьми – не установлена.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СПОСОБНОСТЬ ВОЖДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКИ:

Медицинский продукт не оказывает влияния на способность водить автомобиль или управлять машинным оборудованием.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Признаки аллергических реакций: крапивница, затрудненное дыхание, опухоль лица, губ, языка и горла.

Менее серьезные аллергические реакции:

- сухость, потрескивание или шелушение губ;
- сухость или отслаивание кожи;
- жжение или зуд при нанесение лекарственного препарата

ПЕРЕДОЗИРОВКА:

Передозировка посредством нанесения мази Ацикловир 3%w/w невозможна, в связи с ограниченной чрезкожной абсорбцией.

Для покрытия повреждений, на них следует нанести достаточное количество мази. При нанесении Ацикловира рекомендуется надеть резиновые перчатки для того, чтобы избежать: (1) автоматической инокуляции на другие части тела или (2) передачи инфекции другим людям. Терапию следует начать как можно раньше, при проявление первых знаков или симптомов.

СРОК ГОДНОСТИ:

36 месяцев.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Полутвердая масса белого цвета, заполненная в 5г. тубчик, в свою очередь упакованный в картонную коробку с вкладышем.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель:

cian[®]
CIAN HEALTHCARE LTD.

(An ISO 9001:2015 & WHO GMP Certified Co.)
Khasra No. 248, Vill. Sisona, Bhagwanpur, Roorkee,
Distt. Haridwar, Uttarakhand - 247661, India.
© Regd. Trademark