

# LoraCare

## LORATADINE ORAL SUSPENSION 5mg/5ml

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

- What LoraCare Loratadine Oral Suspension 5mg/5ml is and what it is used for
- Before you take LoraCare Loratadine Oral Suspension 5mg/5ml
- How to take LoraCare Loratadine Oral Suspension 5mg/5ml
- Possible side effects
- How to store LoraCare Loratadine Oral Suspension 5mg/5ml
- Further information

### 1. What LoraCare Loratadine Oral Suspension 5mg/5ml is and what it is used for

This medicine contains Loratadine which belongs to a group of medicines called antihistamines, which act to relieve the symptoms of allergies. LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml can be used in both adults and children over 2 years of age to relieve the symptoms of hayfever (e.g. sneezing, runny and itchy nose and eye irritation). It can also be used to treat raised, red itchy skin (symptoms of urticaria, which is often known as hives or nettle rash).

### 2. Before you take LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml

**Do not take LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml if:**

- you are allergic(hypersensitive) to Loratadine or any of the ingredients in this medicine
- you are pregnant, planning to become pregnant or breastfeeding
- you have severe liver problems (you may need a smaller amount of this medicine)
- you have had an allergic reaction to antihistamines in the past

**Always ask your doctor or your pharmacist before taking this medicine.**

If you are having skin patch testing to identify allergies, stop taking this medicine 48 hours before the tests.

**Taking other medicines**

LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml is not expected to affect any other medicines that you may be taking. However, some medicines may affect the way the active ingredient in this medicine is broken down in the body. Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription, including herbal and homeopathic remedies. It is particularly important if you are taking Erythromycin (an antibiotic), Ketoconazole or fluconazole (for fungal infections) and Cimetidine (for stomach problems).

**Pregnancy and breastfeeding**

The safe use of LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml during pregnancy has not been established. The use of LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml during pregnancy is therefore not recommended. As the active substance in this medicine, Loratadine, is excreted in breast milk, the use of LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml is not recommended in breastfeeding women.

**Driving and using machines**

Loratadine Oral Suspension 5mg/5ml does not normally cause drowsiness in the majority of people taking it. Therefore it will not normally affect your ability to drive or operate machines. However, very occasionally some people do report drowsiness after taking loratadine. If affected do not drive or use machines.

### 3. How to take LoraCare Loratadine Oral Suspension 5mg/5ml

Always take LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

**This medicine is for oral use only.**

#### • Shake the bottle well before use.

Adults and Children over 12 years of age	10ml (10mg) of the oral suspension once daily
Children 2 to 12 years of age with: Body weight more than 30 kg Body weight 30 kg or less	10ml (10mg) of the oral suspension once daily 5ml (5mg) of the oral suspension once daily

#### • Do not give to children under 2 years

If you have severe liver problems your doctor or pharmacist may advise you to take the recommended amount every other day. Do not take more than the amount recommended above.

If you forget to take LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml, take it as soon as you remember, unless it is nearly time for the next dose. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you take more LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml than you should, contact your doctor or pharmacist immediately. Overdose may cause sleepiness or a faster heartbeat. Immediate medical attention should be sought in the event of an overdose.

### 4. Possible side effects

Like all medicines LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml can cause side effects, although not everybody gets them.

If you get any of the side effects in the list below or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

- Side effects from taking LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml may include:
- difficulty in breathing
  - swelling of the face, neck, tongue or throat (severe allergic reactions)
  - headache
  - nervousness
  - tiredness
  - dizziness
  - fast or irregular heartbeat
  - nausea
  - gastritis (an inflammation of the lining of the stomach)

### 5. How to store LoraCare Loratadine Oral Suspension 5mg/5ml

**Keep out of the reach and sight of children.**

Do not use LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml after the expiry date which is stated on the outer carton.

Store below 25°C, away from light. Shelf life after the first opening container is 6 months.

### 6. Further information

#### What LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml contains?

Each 5 ml of oral suspension contains Loratadine 5 mg, which is the active ingredient.

#### What LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml looks like and contents of the pack

30ml Bottle of Oral Suspension.



LoraCare manufactured exclusively for:

**AdvacarePharma USA**

by Advacare Joint-Venture Partner:

Cian Healthcare Ltd.

Khasra No. 248, Vill. Sisona, Bhagwanpur, Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand, India

[www.AdvacarePharma.com](http://www.AdvacarePharma.com)

# LoraCare

## LORATADINE SUSPENSION ORALE 5mg/5ml

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question ou si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela lui pourrait être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

- Qu'est-ce LoraCare 5mg/5ml Suspension orale et dans quel cas est-elle utilisée?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LoraCare 5mg/5ml Suspension orale?
- Comment prendre LoraCare 5mg/5ml Suspension orale?
- Quels sont les effets indésirables possibles?
- Comment conserver LoraCare 5mg/5ml Suspension orale?
- Information complémentaires

#### 1. Qu'est-ce LoraCare 5mg/5ml suspension orale et dans quels cas est-elle utilisée?

Ce médicament contient de la Loratadine qui appartient à un groupe de médicaments appelés antihistaminiques, qui agissent pour soulager les symptômes des allergies. LoraCare 5mg/5ml suspension orale peut être utilisée chez les adultes et les enfants de plus de 2 ans pour soulager les symptômes du rhume (p. ex. éternuements, écoulement nasal, démangeaisons et irritation des yeux). Elle peut également être utilisée pour traiter les démangeaisons sur la peau rouge (symptômes de l'urticaire, souvent connus sous le nom d'urticaire ou d'urticaire de l'ortie).

#### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LoraCare 5mg/5ml Suspension orale?

##### Ne prenez pas LoraCare 5mg/5ml suspension orale si:

- vous êtes allergique (hypersensible) à la Loratadine ou à l'un des ingrédients de ce médicament
- vous êtes enceinte, vous prévoyez le devenir ou vous allaitez
- vous avez de graves problèmes de foie (vous pourriez avoir besoin d'une plus petite quantité de ce médicament)
- vous avez déjà eu une réaction allergique aux antihistaminiques dans le passé

##### Demandez toujours à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Si vous faites des tests cutanés pour identifier les allergies, cessez de prendre ce médicament 48 heures avant les tests.

##### Prise d'autres médicaments

LoraCare 5mg/5ml suspension orale ne devrait pas affecter les autres médicaments que vous prenez. Cependant, certains médicaments peuvent affecter la façon dont l'ingrédient actif de ce médicament est décomposé dans l'organisme. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris des médicaments obtenus sans ordonnance, y compris des remèdes à base de plantes médicinales et homéopathiques. Il est particulièrement important si vous prenez de l'érythromycine (un antibiotique), du kétocanazole ou du fluconazole (pour les infections fongiques) et de la cimétidine (pour les problèmes gastriques).

##### Grossesse et allaitement

L'innocuité de LoraCare 5mg/5ml suspension orale pendant la grossesse n'a pas été établie. L'utilisation de la suspension orale LoraCare 5mg/5ml pendant la grossesse n'est donc pas recommandée. Comme la substance active de ce médicament, la loratadine, est excrétée dans le lait maternel, l'utilisation de LoraCare 5mg/5ml suspension orale n'est pas recommandée chez les femmes allaitantes.

##### Effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

LoraCare 5mg/5ml suspension orale ne provoque normalement pas de somnolence chez la majorité des personnes qui la prennent. Par conséquent, cela n'affectera normalement pas votre capacité à conduire ou à faire fonctionner des machines. Cependant, il arrive très rarement que certaines personnes fassent état de somnolence après avoir pris de la loratadine. En cas d'atteinte, ne pas conduire ou utiliser de machines.

### 3. Comment prendre LoraCare 5mg/5ml Suspension orale?

Prenez toujours LoraCare 5mg/5ml suspension orale exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. Vous devriez consulter votre médecin ou votre pharmacien si vous n'êtes pas certain.  
**Ce médicament est à usage oral seulement.**

#### • Bien secouer le flacon avant usage.

Adultes et enfants de plus de 12 ans	10 ml (10 mg) de solution orale une fois par jour
Enfants de 2 à 12 ans avec: Un poids supérieur à 30 kg Un poids de 30 kg ou moins	10 ml (10 mg) de solution orale une fois par jour 5 ml (5 mg) de solution orale une fois par jour

#### • Ne pas donner aux enfants de moins de 2 ans

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, votre médecin ou votre pharmacien peut vous conseiller de prendre la quantité recommandée tous les deux jours. Ne prenez pas plus que la quantité recommandée ci-dessus.

**Si vous oubliez de prendre LoraCare Suspension orale 5mg/5ml,** Prenez-le dès que vous vous en souvenez, à moins qu'il ne soit presque l'heure de prendre la dose suivante. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

**Si vous prenez plus de Suspension orale LoraCare 5mg/5ml que vous ne le devriez,** contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. Un surdosage peut causer de la somnolence ou un rythme cardiaque plus rapide. En cas de surdosage, il faut consulter immédiatement un médecin.

### 4. Effets indésirables possibles

Comme tous les médicaments, LoraCare Oral Suspension 5mg/5ml peut causer des effets secondaires, mais tout le monde n'en a pas.

**Si vous ressentez l'un des effets indésirables énumérés ci-dessous ou si vous remarquez des effets indésirables qui ne figurent pas dans cette notice, veillez à informer votre médecin ou votre pharmacien.**

Les effets indésirables de la prise de LoraCare Suspension orale 5mg/5ml peuvent inclure:

- difficulté respiratoire
- enflure du visage, du cou, de la langue ou de la gorge (réactions allergiques graves)
- mal de tête
- anxiété
- fatigue
- vertige
- pouls rapide ou irrégulier
- nausée
- gastrite (inflammation de la paroi de l'estomac)

### 5. Comment conserver LoraCare Suspension orale 5mg/5ml?

**Ne laisser ni la la portée ni la vue des enfants.**

Ne pas utiliser la suspension orale LoraCare 5mg/5ml après la date de péremption indiquée sur l'emballage extérieur.

Conserver à une température inférieure à 25°C, à l'abri de la lumière. La durée de conservation après la première ouverture du contenant est de 6 mois.

### 6. Information complémentaires

#### Que contient la suspension orale LoraCare 5mg/5ml?

Chaque 5 ml de solution orale contient 5 mg de Loratadine, l'ingrédient actif.

**A quoi ressemble la suspension orale LoraCare 5mg/5ml et le contenu de l'emballage**

Flacon de 30 ml de Suspension Orale.



LoraCare fabriqué exclusivement pour:

**AdvacarePharma USA**

Par son Partenaire Associé:

Cian Healthcare Ltd.

Khasra No. 248, Vill. Sisona, Bhagwanpur, Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand, India

[www.AdvacarePharma.com](http://www.AdvacarePharma.com)