

СПАЗМОВЕРИН

(200 мг мебеверина гидрохлорида)

Лекарственная форма:

Капсулы пролонгированного действия.

Состав:

в 1 капсуле содержится 200 мг мебеверина гидрохлорида.

Вспомогательные вещества q.s.

Фармакотерапевтическая группа

Спазмолитическое средство

Код АТХ: А03 АА04

Фармакологическое действие:

Спазмолитик миотропного действия, оказывает прямое действие на гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта. Устраняет спазм без влияния на нормальную перистальтику кишечника. Не обладает антихолинергическим действием.

Фармакокинетика

Данная лекарственная форма позволяет использовать схему дозирования 2 раза в день. Мебеверин полностью метаболизируется в организме человека. Первый этап метаболизма - гидролиз с образованием вератровой кислоты и спирта мебеверина. Метаболиты мебеверина (вератровая кислота и спирт мебеверина) выводятся почками. Спирт мебеверина выводится частично в виде карбоновой кислоты и частично в виде деметилированной карбоновой кислоты. Основным метаболитом, циркулирующим в плазме, является деметилированная карбоновая кислота. Период полувыведения в равновесном состоянии деметилированной карбоновой кислоты составляет приблизительно 5,77 ч. При многократной дозе (200 мг два раза в день) максимальная концентрация деметилированной карбоновой кислоты в крови (С_{max}) составляет 804 нг/мл, время достижения максимальной концентрации деметилированной карбоновой кислоты в крови (Т_{max}) - около 3 часов. Данная лекарственная форма мебеверина имеет свойства длительного высвобождения, что очевидно из ее относительно низкого значения С_{max}, более продолжительного времени в отношении значения Т_{max} и длительного периода полувыведения при оптимальной биодоступности.

Показания к применению:

Симптоматическое лечение боли, спазмов, дисфункции и дискомфорта в области кишечника, связанных с синдромом раздраженного кишечника. Симптоматическое лечение спазмов органов желудочно-кишечного тракта (в т. ч. обусловленных органическими заболеваниями).

У детей старше 12 лет:

функциональные расстройства ЖКТ, сопровождающиеся болью в животе.

Способ применения и дозы

Принимать внутрь, не разжевывая, с достаточным количеством воды (не менее 100 мл). По одной капсуле

(200 мг) 2 раза в сутки, одна - утром и одна - вечером, за 20 минут до еды.

Особые указания

В период лечения следует соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и во время занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Противопоказания

Гиперчувствительность к любому компоненту препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Спазмoverин не описано.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Клинические данные о лечении беременных женщин отсутствуют. Назначать препарат беременным женщинам следует с осторожностью, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Информации об экскреции мебеверина в материнское молоко недостаточно. Не следует принимать Спазмoverин во время кормления грудью.

Побочное действие

Редко — головокружение, крайне редко — крапивница, отек Квинке, отек лица и экзантема..

Передозировка

Симптомы: повышение возбудимости ЦНС (теоретически).

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия. Специфический антидот неизвестен.

Срок хранения

3 года. Не использовать после истечения срока годности.

Форма выпуска

в блистере 10 шт.; в пачке картонной 3 блистера.

Условия хранения

В защищенном от света и влаги месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

Cian Healthcare Pvt. Ltd.

Khasra No.: 248, Village Sisona, Bhagwanpur, Roorkee, Haridwar, Uttarakhand, India.